



سنوات من العمل الجاد والمتواصل

سنوات من البحث والاعتماد على الأفضل

سنوات من الاختبارات والانتقاء للحصول على

أحدث المعدات لإنتاج أفضل المركبات فعالية وأماناً

الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس لزراعة و إنتاج أفضل

المبيدات الفطرية

- | | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 1 - ديفازيم بودرة | 13 - كلوبيس | 25 - لاتكس |
| 2 - ديفازيم سائل | 14 - غالستار | 26 - بولك |
| 3 - هيكسازول | 15 - ستروبيل | 27 - دو ريمكس |
| 4 - أغري ميل | 16 - لورد | 28 - أغريت بلس |
| 5 - سبيرو | 17 - سولفين | 29 - تروي |
| 6 - أغري سبيرو | 18 - سولفين داست | 30 - كورال |
| 7 - سكالين | 19 - أغري غولد | 31 - أغري مول |
| 8 - نيوكار | 20 - برينس | |
| 9 - أغري سين | 21 - رودكس فورت | |
| 10 - بانتكس | 22 - ميداكس | |
| 11 - دومينو | 23 - كاربين | |
| 12 - بايدون | 24 - بيس مان | |

Mob :

+963-960033770 / 960033771

E-mail :

info@agripes.com - sales@agripes.com

Website :

www.agripes.com - www.facebook.com/agripes

الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس



ديفازيم

500 مسحوق قابل للبلل

- * **خصائص المبيد :** مبيد فطري جهازى وقائى علاجي يمتص عن طريق الجذور والأنسجة الخضراء للقضاء على الأمراض الفطرية التي تصيب الأشجار المثمرة والكرمة والمحاصيل الخضرية .
- * **التركيب ونسبة المادة الفعالة :** يحتوي على ٥٠ ٪ من مادة كاربندازيم .
- * **السمية النباتية :** المبيد لايسبب سمية نباتية وتحمله جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .
- * **السمية للنحل والطيور والأسماك :** غير سام عملياً للطيور والنحل وسام للأسماك .
- * **التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية :**
- * **(WHO Class III +)** من غير المحتمل حدوث أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوح بها .
- * **قابلية المزج :** قابل للمزج مع معظم المبيدات ما عدا القلووية منها .
- * **فترة الأمان لجني المحصول :** يمكن جني المحصول بعد أسبوعين لكافة المحاصيل بعد الرش .
- * **مجالات ونسب الاستعمال لمكافحة مرض البقع (الجرب) :**
- * **يستعمل بمعدل ٣٠ - ٥٠ غ / ١٠٠ لتر ماء .** البياض الدقيقي بمعدل ٥٠ غ / ١٠٠ لتر ماء .
- * **أمراض التخزين :** يستخدم قبل إسبوعين من الحصاد بمعدل : ٥٠ غ / ١٠٠ لتر ماء .
- * **وبعد الحصاد** تغطس الثمار بمحلول من المبيد بنسبة : ٥٠ غ / ١٠٠ لتر ماء .
- * **المونياليا :** يستخدم بمعدل ٣٠ - ٥٠ غ / ١٠٠ لتر ماء .
- * **الشمش والدراق :** لمكافحة مرض المونياليا يستخدم بمعدل : ٣٠ - ٥٠ غ / ١٠٠ لتر ماء .
- * **أمراض التخزين** يستخدم بمعدل : ٥٠ - ١٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء .
- * **الكرمة :** لمكافحة أمراض البياض الدقيقي والبوترايس يستخدم بمعدل : ٥٠٠ - ٨٠٠ غ/هكتار . الأتراركو يستخدم بمعدل ٥٠ غ/١٠٠ لتر ماء .
- * **تنبيه :** إن تكرار استعمال ديفازيم ٥٠٠ منفرداً ولمدة طويلة قد يتسبب في ظهور سلالات مقاومة لمفعول مركبات البنزيميدازول لذلك ينصح برش ديفازيم ٥٠٠ إما بالتناوب أو بخلطه مع مبيدات فطرية أخرى غير جهازية .

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أفري بيس





ديفازيم

500 مركز معلق

خصائص المبيد : مبيد فطري جهازى (وقائي وعلاجي) يستخدم بشكل واسع ضد مجموعة كبيرة من الأمراض التي تصيب الكرمة ، الفاكهة ، المحاصيل الحقلية ، الخضار ، نباتات الزينة .

التركيب ونسبة المادة الفعالة : كاربنديازيم ٥٠ % ٥٠٠ غ / ل + مواد ناشرة ولاصقة ٥٠ % .

السمية النباتية : تتحمله جميع المحاصيل بشكل جيد وفق معدلات الاستخدام المنصوح بها .

السمية للنحل والطيور والأسماك :

سام للأسماك غير ضار للنحل والطيور .

التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية :

(WHO Class III +) من غير المحتمل حدوث أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوح بها .

قابلية المزج : قابل للمزج مع معظم المبيدات الفطرية ما عدا القلووية منها مثل مسحوق

بورديو والكبريت الكلسي وسلفات النحاس .

فترة الأمان لجني المحصول :

١٠ - ١٥ يوم .

معدل استخدام	الآفة	المحاصيل
١٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	البياض الدقيقي على الخيار في الزراعات المحمية (كمبيد علاجي)	الاعتماد المحلي
٢٥ - ١٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	الحرب (فينتوريا) البياض الدقيقي والصدأ	التفاحيات
٢٥ - ١٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	العفن البني (المونييا)	اللوزيات
٢٥ - ١٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	العفن الرمادي (بوتريس)	الفريز
٢٥ - ١٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	العفن الرمادي (بوتريس) البياض الدقيقي	العنب
١٥٠ - ٤٠٠ مل / هكتار	تبقع الأوراق (سرкосورا) البياض الدقيقي	الشوندر السكري
٢٥ - ١٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	تبقع الأوراق (سيكلونوم)	الزيتون
٢٥ - ١٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	العفن الأخضر	الحمضيات
٢٥ - ١٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	العفن البني ، تبقع الأوراق ، عفن الساق	الخضار
٢٥ - ١٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	أمراض الذبول (فيوزاريوم) ، تبقع الأوراق العفن الرمادي (بوتريس) والانثراكوز	القرعيات

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المحروعات أغري بيس





هيكسازول

5 مركز معلق

- * **خصائص المبيد :** مبيد فطري جهازى سريع الامتصاص يستخدم كمبيد وقائي وعلاجي ولا يترك أي أثر للرش على النبات يستخدم لمكافحة البياض الدقيقي - الجرب - والأصداء على العنب وأشجار الفاكهة والخضراوات والأمراض الأساسية لمحاصيل الحبوب الخضراء .
- * **التركيب ونسبة المادة الفعالة :** هيكساكونازول : ٥٠ غ / ل .
- * **السمية النباتية :** المبيد لا يسبب سمية نباتية وتحمله جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .
- * **السمية للنحل والطيور والأسماك :** قليل السمية للطيور والنحل ومتوسط السمية للأسماك .
- * **التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية :** (WHO Class III +)
- من غير المحتمل حدوث أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوح بها .

المحصول	المرض	معدل الاستخدام مل/ ١٠٠ لتر ماء
الاعتماد المحلي	البياض الدقيقي على العنب	٤٠ مل
التفاح	البياض الدقيقي ، الجرب ، الصدأ	٤٠ مل
الدراق	البياض الدقيقي ، المونييا ، الجرب	١٠٠ - ٢٠٠ مل
الخضراوات	البياض الدقيقي	١٠٠ مل
الصبغ	البياض الدقيقي	٥٠ - ١٠٠ مل
الزيتون	تبقع الأوراق	٥٠ - ١٠٠ مل
الورود ونباتات الزينة	البياض الدقيقي ، الصدأ	٥٠ - ١٠٠ مل

- * **قابلية المزج :** قابل للمزج مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية ماعدا القلوية منها .
- * **فترة الأمان لجني المحصول :** يمكن جني المحصول بعد ١٥ يوم من الرش لمعظم المحاصيل .
- * **معدلات الاستخدام :**
- يستعمل التركيز الأعلى في حالة الإصابة الشديدة ولإطالة الفترة الزمنية بين الرشات .

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس



أغري ميل

72 مسحوق قابل للبلل



* خصائص المبيد : مبيد فطري ذو تأثير جهازى وبالملاسة ذو فعالية للقضاء على أمراض

البياض الزغبي واللفحة المبكرة والمتأخرة والأمراض المشابهة الأخرى .

* التركيب ونسبة المادة الفعالة : ٨ ٪ ميتالاكسيل وزن / وزن ٦٤ ٪ مانكوزيب وزن / وزن .

* السمية النباتية : المبيد لا يسبب سمية نباتية وتحمله جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها إلا أن

مادة المانكوزيب عندما تلامس نباتات يافعة قد تسبب لها بعض الحروق لذلك ينصح بعدم استعمال أغري ميل في مرحلة الورقة الرابعة وخاصة في مشاتل التبغ .

* التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية : خفيف السمية (WHO Class III) .

* السمية للنحل والطيور والأسماك :

سام للأسماك ومتوسط السمية للنحل والطيور .

* قابلية المزج : قابل للخلط مع معظم المبيدات

ماعددا القلوية منها .

* فترة الأمان لجني المحصول :

يمكن جني المحصول لنبات البطاطا والتبغ

والبصل بعد ٧ أيام من الرش

الكرمة ١٥ يوم .

البندورة بعد ٣ أيام .

الخس والفول والقرنبيط بعد ١٤ يوم .

المحصول	الممرض	معدل الاستخدام غ / ١٠٠ لتر ماء
البندورة	اللفحة المبكرة	٣٥٠ غ
الكرمة	البياض الزغبي	٢٥٠ غ
البطاطا	اللفحة المبكرة والمتأخرة	٢٥٠ غ
الخيار	البياض الزغبي	٣٥٠ غ
التبغ	البياض الزغبي	٣٠٠ غ
البصل	البياض الزغبي	٢٥٠ غ
الفول	البياض الزغبي	٢٥٠ غ
الشوندر السكري	البياض الزغبي	٢٥٠ غ
القرعيات	البياض الزغبي	٢٥٠ غ
الملفوف	البياض الزغبي	٢٥٠ غ
الخس	البياض الزغبي	٢٥٠ غ
القرنبيط	البياض الزغبي	٢٥٠ غ

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





سبيرو

30 مركز سيال معد لمعاملة البذار

* **خصائص المبيد :** معقم بذار فطري ذو فعالية جهازية واسع الطيف محضر خصيصاً لتعقيم بذار القمح والشعير ضد الأمراض المحمولة عليها أو الأمراض المتواجدة في التربة دون أي تأثير على عملية الإنبات .

* **التركيب ونسبة المادة الفعالة :** دافينيو كونازول ٣٠ غ / ل .

* **السمية النباتية :** المبيد لا يسبب سمية نباتية ويتحمله جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .

* **السمية للنحل والطيور والأسماك :** غير سام للنحل والطيور وديدان الأرض النافعة لكنه سام للأسماك .

* **التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية :** متوسط السمية (WHO Class II) .

* **قابلية المزج :** قابل للخلط والمزج مع مركبات تعقيم البذار الأخرى .

* **طريقة التأثير :** جهازية مع تأثير وقائي وعلاجي يؤثر على الفطور يمنع تركيب الإبر غوستيرول الضروري لتركيب الجدر الخلوية للفطر . يدخل المركب البادرات عن طريق البذار ويتوضع فيها حيث يؤمن حماية ضد الأمراض .

ميزاته : لا يؤثر على الإنبات ولا يوجد أي سمية للنبات حتى لو زاد معدل الاستخدام . له كفاءة عالية في القضاء على الأمراض الموجودة داخل

الحبة (تقح سائب - فيوزاريوم) وكذلك خارج الحبة (تقحم نتن و مغطى) يؤمن حماية للبذار خلال بقائها في التربة أثناء عملية الإنبات .

سهل التعامل وليس له رائحة كريهة ولا يسبب تخرش للجلد والعين . يجب إبعاد الطيور عن التهام البذار المعاملة الموجودة داخل التربة .

ملاحظة : يمكن استخدامه في تعقيم بذار الحمص للوقاية من مرض الأسكويتا حيث أثبتت الدراسات المحلية نجاحه في الوقاية من هذا المرض وحمايته للنبات حتى في طور البادرة ولو تم استخدامه بجرعة مضاعفة لا يحدث أي سمية للبادرة . كما يمكن استخدامه في تعقيم بذار القطن والبقول السوداني .

معدلات الاستخدام : الاعتماد المحلي : لتعقيم بذار القمح والشعير ضد أمراض التقحم بمعدل استخدام : ١ لتر / ١ طن بذار .

المحصول	المرض	نسبة الاستخدام
القمح	التفحم المغطى (التنت)	١٠٠ سم / لكل ١٠٠ كغ بذار
	التفحم السائب سيتوريا	١٠٠ سم / لكل ١٠٠ كغ بذار
الشعير	التفحم المغطى	١٠٠ سم / لكل ١٠٠ كغ بذار
	التفحم السائب	١٠٠ سم / لكل ١٠٠ كغ بذار

المبيدات الفطرية

أغري سبيرو

60 مسحوق قابل للبلل



- * **خصائص المبيد :** مبيد فطري غير جهاززي ذو تأثير وقائي لتعقيم البذار ضد مجموعة واسعة من الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية وهو ملائم لتعقيم بذار الحبوب (قمح - شعير) الذرة البطاطا والخضراوات .
- * **التركيب ونسبة المادة الفعالة :** مانكوزيب ٦٠٠ غ / كغ .
- * **السمية النباتية :** عند استعمال النسب الموصى بها بالششرة لا تظهر إي سمية .
- * **السمية للنحل والطيور والأسماك :** سام للأسماك غير سام للنحل والطيور .
- * **التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية :** (WHO class III) من غير المحتمل حدوث أي أضرار ضمن معدلات الاستخدام المنصوح بها .
- * **قابلية المزج :** قابل للخلط مع معقمات البذار الحشرية شائعة الاستخدام .

* **ملاحظة :**

- يخلط حتى تتلون جميع البذور باللون الأحمر .
- * **الاعتماد المحلي :** لتعقيم بذار القمح ضد مرض التفحم المغطى معدل الاستخدام ٢ كغ / طن .
- * **مميزات المبيد :**
- ١ - لون أحمر يعطيه خاصية تمييز البذار المعقمة بواسطته .
- ٢ - فعالية عالية ضد مجموعة واسعة من الأمراض التي تصيب البذور .
- ٣ - لا يؤثر على إنبات البذور ونموها وإنما يقوي النبات ويزيد إنتاجيته .
- ٤ - آمن على الإنسان والثدييات خصوصاً .

المحصول	المرض	نسبة الاستخدام
القمح و الشعير	التفحم المغطى الذبول والتبقعات	٢ كغ / ١ طن بذور
الذرة	التفحم السائب والذبول و تلطخ الأوراق	٣ كغ / ١ طن بذور
الخضار	الذبول وعفن الجذور	٤٠٠ - ٨٠٠ غ ١٠٠ كغ بذار
البطاطا	القشرة السوداء وجرب البطاطا	١ كغ / ٢٠٠ لتر لكل طن تقاوى
القطن	أمراض الذبول والرايزوكتونيا	٨٠٠ غ ١٠٠ كغ بذار

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





سكالين

400 معلق مركز

* خصائص المبيد : مبيد فطري ملامسة وإختراقي يكافح مرض العفن الرمادي على الكرمة والفريز والخضار

والبازيلاء يدخل في برامج مكافحة المتكامل IPM .

* التركيب ونسبة المادة الفعالة : بيرى ميثانيل ٤٠٠ غ / ل .

* السمية النباتية : المبيد لا يسبب سمية نباتية وتحمله كافة المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها في هذه النشرة .

* السمية للنحل والطيور والأسماك : متوسط السمية للأسمك متوسط إلى خفيف السمية للطيور والنحل .

* التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية (+ WHO Class III) من غير المحتمل حدوث أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوح بها .

* قابلية المزج : قابل للمزج مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية ماعدا القلوية منها وذات القاعدة الكبريتية .

* طريقة التأثير : ملامسة وإختراقي له تأثير وقائي وعلاجي يتدخل بتنشيط إفراز الأنزيم الضروري لحدوث الإصابة و يبطئ أنبوب الإنشاش و غو مشبعة الفطر .

يخترق سطح الأوراق وينتقل داخل أنسجة النبات .

* معدلات الاستخدام :

يستخدم المبيد على المحاصيل الواردة أدناه ،

وفق برنامج الاستخدام التالي :

لمكافحة البوتريتس - العفن الرمادي :

Botrytes cinerea

* الاعتماد المحلي : لمكافحة العفن الرمادي على

البندورة بمعدل ١٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء .

المحصول	نسبة الاستخدام	محلل الرش لتر / هكتار	فترة ماقبل الجني
الكرمة	٢ - ٢,٥ لتر / هكتار	٨٠٠ - ١٤٠٠	٢١ يوم
الفريز	٢ لتر / هكتار	٤٠٠ - ١٠٠٠	٣ يوم
الخضار المكشوفة : بندورة - فاصولياء بازيلاء	١,٥ - ٢ لتر / هكتار	٦٠٠ - ١٥٠٠	٣ يوم
الخضار البلاستيكية : بندورة و خيار	١٥٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	١٥٠٠	٣ يوم

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس



نيوكار

40 سائل مركز قابل للاستحلاب

* خصائص المبيد : مبيد فطري جهاززي متخصص وقائي و علاجي يستخدم في مكافحة أمراض التبغ

والبياض الدقيقي على التفاحيات . مبيد عالي الفعالية من عائلة التريازول التي تقوم بتثبيط التركيب الحيوي

لإرجوستيروول الفطر . المبيد يكافح مجموعة واسعة من الأمراض الفطرية وله تأثير وقائي طويل . وكذلك فإن له تأثير علاجي .

* التركيب ونسبة المادة الفعالة : فلوزيلازول ٤٠٠ غ / ل .

* السمية النباتية : المبيد لايسبب سمية نباتية وتحتمله جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .

* السمية للنحل والطيور والأسماك : خفيف السمية للنحل والطيور متوسط السمية للأسماك .

* التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية : متوسط السمية (WHO Class II) .

* قابلية المزج : قابل للمزج مع معظم المبيدات الحشرية و الفطرية ماعدا القلوية منها .

* فترة الأمان لجني المحصول :

٢٨ يوماً بالنسبة للشوندر السكري والخضراوات

والكرمة و النجيليات ،

١٤ يوماً بالنسبة للتفاحيات

٧ أيام بالنسبة للدراق .

معدلات الاستخدام :

الاعتماد المحلي : لمكافحة البياض الدقيقي

على العنب بمعدل ٧٥ مل / للهكتار .

المحصول	المرض	نسبة الإستعمال
التفاح	البياض الدقيقي الجرب	٧,٥ مل / ١٠٠ لتر ٥ مل / ١٠٠ لتر
الشوندر السكري	التبغ السيركوسوري ، البياض الدقيقي	١٥٠ - ٢٠٠ سم / هكتار
الدراق	عفن المونيليا البياض الدقيقي	٧,٥ سم / ٣ / ١٠٠ لتر ماء (٧٥ - ١٠٠ سم / ٣ / هكتار)
النجيليات	البياض الدقيقي ، الصدأ	٢٠٠ - ٣٠٠ سم / هكتار
الكرمة	البياض الدقيقي	٧٥ مل / هكتار

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس



أغري سين

70 بودرة قابلة للبلل



خصائص المبيد : مبيد فطري جهازى وقائى وعلاجى ذو طيف واسع في مكافحة عدد كبير من الأمراض على المجاميع الخضرية والجذور والثمار والمحاصيل والأشجار المثمرة والخضار والمروج كما يستخدم لتعقيم جذور الفراس والأبصال والدرنات ويستخدم للحماية من أمراض التخزين داخل البرادات والمستودعات .

التركيب ونسبة المادة الفعالة :

يحتوي على ثيوفانات الميثيل ٧٠ ٪ (وزن / وزن) .

السمية النباتية : المبيد لايسبب سمية نباتية وتتحمله

جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت

ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .

السمية للنحل والطيور والأسماك :

غير سام للنحل ، سام للطيور والأسماك .

التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية :

(+ WHO Class III) من غير المحتمل حدوث

أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوص بها .

قابلية المزج : قابل للمزج مع معظم المبيدات الشائعة

الأخرى باستثناء المركبات النحاسية والقلوية مثل

محلول بوردو وعند الشك قم باختيار المزيج .

فترة الأمان لجني المحصول : ١٠ أيام للنفاخ والأجاص

والحمضيات ويوم واحد لباقى المحاصيل المستهدفة .

طريقة التأثير : يؤثر المبيد على الفطر بتداخله في

عملية الانقسام الخلوي للخلايا (يمنع تشكل الغزل)

كما يخفض معدل التنفس ومعدل تركيب الأحماض النووية .

معدلات الاستخدام :

الاعتماد المحلي : لمكافحة البياض الدقيقي وقائياً

على الخيار بمعدل (٠,٧ كغ / للهكتار) .

المحصول	المرض	معدل الرش
العنب	البياض الدقيقي - العفن الرمادي - الأنتراكنوز - نفع الأوراق	٥٠ - ١٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء
القمح والأجاص	الحرب - بقع الثمار - البياض القلبي	٥٠ - ٦٧ غ / ١٠٠ لتر ماء
الفواكه	عفن بني - حرب - أنتراكنوز - عفن فروموسيس - عفن رايزوس	٦٧ - ١٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء
الخضروات	الحرب	٧ - ١٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء
القرع	البياض الدقيقي - العفن الرمادي (بوتريانس)	٧ - ١٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء
القمح والشعير	البياض الدقيقي - العفن الرمادي - نفع الأوراق - عفن رايزوس	٥٠ - ١٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء
الشونيز السكرى	نفع سركسوز على الأوراق	٣٠٠ - ٥٠٠ غ / هـ
البندورة	العفن الرمادي - عفن البساق - عفن الأوراق - ذبول هراوم وذلك بمعالجة التربة	٦٧ - ١٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء
الباذنجان	البياض الدقيقي - العفن الرمادي - العفن الأسود - العفن الأبيض (ميكوروتيا) ذبول (فوزاريوم وفوتيسليوم)	٥٠ - ١٠٠ غ / هـ
الفرعيات	العفن الرمادي - الحرب - البياض الدقيقي - نفع الأوراق - للثة تصنع الساق الأنتراكنوز - ذبول (فوزاريوم وفوتيسليوم)	٧ - ١٠٠ غ / هـ
الفليلة والخس	العفن الرمادي - العفن الأبيض - البياض الدقيقي - نفع الأوراق - الأنتراكنوز	٥٠ - ١٠٠ غ / هـ
الملقوف والطماطة	العفن الأبيض (ميكوروتيا)	٧ - ١٠٠ غ / هـ
البصل	عفن الرقبة الرمادي (بوتريانس)	٧ - ١٠٠ غ / هـ
البغ	البياض الدقيقي	٧ - ١٠٠ غ / هـ
أبصال الزينة	ذبول فوزاريوم	١٠٠ - ٢٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء
نباتات الزينة	العفن الرمادي - العفن الأبيض - البياض الدقيقي	٧ - ١٠٠ غ / هـ
غراس الأشجار	عفن الجذور الأبيض (تعفيس للجلود)	٢٠٠ - ٤٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء
المروج الخضراء	العفن الأبيض وعفن رايزوس	٧ - ١٠٠ غ / هـ
الفطر الزراعي	ذبول فوزيسليوم والعفن الأزرق	٥٠ - ٦٧ غ / ١٠٠ لتر ماء
فواكه التخزين	عفن التخزين - العفن الرمادي (بوتريانس)	٥٠ - ١٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء
	تعفيس للثمار بعد القطف :	٥٠ - ٦٧ غ / ١٠٠ لتر ماء

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





بانتيكس

722 سائل مركز قابل للذوبان في الماء

* **خصائص المبيد :** مبيد فطري جهازى ذو فعالية جيدة للقضاء على الأمراض الفطرية كالبيض الزغبي واللفحة الماخرة والبشيم والفاينوفورا على الخضار ونباتات الزينة والبندورة والتبغ والبطاطا والخس والقرعيات كالحيار والكوسا والبطيخ الأحمر والشمام واليقطين يكافح مجموعة كبيرة من أمراض الذبول في التربة

* **التركيب ونسبة المادة الفعالة :**

بروباموكارب هيدروكلوريد ٧٢٢ غ/ل (وزن/حجم) .

* **السمية النباتية :** المبيد لا يسبب سمية نباتية ويتحملة جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .

* **السمية للنحل والطيور والأسماك :**

خفيف السمية للنحل والطيور والأسماك .

* **التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية :** خفيف السمية (WHO Class III) .

* **قابلية المرح :** قابل للمزج مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية ماعدا الفلوية منها وذات القاعدة الكبريتية .
* **فترة الأمان لجني المحصول :** يمكن جني المحصول بالنسبة للبندورة ، البطاطا ٧ أيام ، الخس ٢١ يوم .
* **الكوسا ، الحيار ، البطيخ ، الشمام بعد ٣ أيام من الرش .**
* **طريقة التأثير :** مبيد فطري جهازى وله تأثير وقائي يمتص عن طريق الأوراق والجذور بسرعة جيدة .
* **ملاحظة :**

تنقع الأضبال بالمحلول من ٦٠ - ١٠٠ سم لكل ٢٠ لتر ماء وذلك لمدة (٢٥ - ٣٥) دقيقة .
* **أجهزة الرش :** استعمل الموشات الظهرية التقليدية ومروشة الزراع والفالات الخاصة بمبيدات الأعشاب .

المحصول	المرض	نسبة الاستعمال	طريقة الاستعمال
البندورة البطاطا	اللفحة الماخرة	٣ - ٥ لتر للهكتار	للمكافحة عن طريق المجموع الخضري
	أمراض الذبول في التربة	٤٠ - ٥٠ سم لكل ٢٠ لتر ماء	سقاية بعد زراعة البذور مباشرة، وحتى إنبات الورقوتين الأساسيتين للنبات
		٢٥ - ٣٥ سم لكل ٢٠ لتر ماء	سقاية للشتل قبل نقلها للتربة الدائمة ب ٨ أيام
		٤٠ - ٥٠ سم لكل ٢٠ لتر ماء	سقاية بعد التشثيل في الأرض الدائمة
الخس ، اليقطين الكوسا البطيخ، الشمام	البيض الزغبي	٢ - ٤ لتر للهكتار	للمكافحة عن طريق المجموع الخضري
		٤٠ - ٥٠ سم لكل ٢٠ لتر ماء	سقاية بعد زراعة البذور مباشرة، وحتى إنبات الورقوتين الأساسيتين للنبات
		٢٥ - ٣٥ سم لكل ٢٠ لتر ماء	سقاية للشتل قبل نقلها للتربة الدائمة ب ٨ أيام
		٤٠ - ٥٠ سم لكل ٢٠ لتر ماء	سقاية بعد التشثيل في الأرض الدائمة
نباتات الزينة	البيض الزغبي	١,٥ - ٣ لتر للهكتار	للمكافحة عن طريق المجموع الخضري بعد الزراعة وقبل التشثيل
		٤٠ - ٥٠ سم لكل ٢٠ لتر ماء	

المبيدات الفطرية





دومينو

100 سائل مركز قابل للاستحلاب

* **خصائص المبيد :** مبيد فطري جهازى وقائى وعلاجى يستخدم لمكافحة أمراض البياض الدقيقي والصدأ على الخضراوات والأشجار المثمرة والتبغ و نباتات الزينة .

* **التركيب ونسبة المادة الفعالة :**

بنكونازول ١٠٠ غ / ل .

* **السمية النباتية :** تتحمل جميع المحاصيل ضمن معدلات الاستخدام الموصح بها .

* **السمية للنحل والطيور والأسماك :**

سام للأسماك وغير سام للطيور والنحل .

* **التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية :**

خفيف السمية (WHO Class III) .

* **قابلية المزج :** قابل للمزج مع معظم المبيدات الحشرية

والفطرية ماعدا القلوية منها وذات القاعدة الكبريتية .

* **فترة الأمان لجني المحصول :** التبغ ، الكرمة ،

التفاحيات ١٤ يوم - الخيار ٣ أيام .

البندورة ، الفاصولياء ، البازلاء ، الفليفلة واللوزيات ٧ أيام .

* **طريقة التأثير :** مبيد فطري يكافح مرض العفن

البي على الكرمة والقرنيز والخضار والبازلاء

كما يكافح الجرب ولقحة الترناريا على التفاح

والتبغ على الأجناس .

المحصول	المرض	نسبة الاستخدام مل / ١٠٠ لتر ماء	الفترة بين الرشتين
البندورة - خيار بازلاء	البياض الدقيقي	٢٠ - ٢٥	أسبوعين
الفاصولياء فليفلة	الصدأ البياض الدقيقي	١٠٠	أسبوع
الكرمة	البياض الدقيقي	٢٥	أسبوعين
التفاح	البياض الدقيقي الجرب	٢٥ ٥٠	أسبوع - أسبوعين
المشمش	البياض الدقيقي المونييا	٥٠ - ٦٠	أسبوع - أسبوعين
الكرز	البياض الدقيقي تبغ الأوراق	٣٠ ٥٠	اسبوعين
الدراق	البياض الدقيقي	٢٥ - ٥٠	أسبوعين
نباتات الزينة	البياض الدقيقي الصدأ	٢٥ ١٠٠	أسبوعين
التبغ	البياض الدقيقي	٥٠	أسبوعين

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





بايدون

250 سائل مركز قابل للاستحلاب

* **خصائص المبيد :** مبيد فطري للقضاء على امراض البياض الدقيقي والصدأ وله تأثير على امراض

كثيرة مثل التبقع التي تصيب الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية (حبوب - خضراوات) والعنب .

يمتاز بصفاته الجهازية الجيده استمرارية استخدامه تعطي تأثير جيد حيال الاصابة بالمرض على براعم التفاح .

* **التركيب ونسبة المادة الفعالة :** تريا ديميفون ٢٥٠ غ / ل (وزن / وزن) .

* **السمية النباتية :** المبيد لايسبب سمية نباتية وتحمله جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .

* **السمية للنحل والطيور والأسماك :** سام للأسماك وخفيف السمية للطيور وغير سام للنحل .

* **التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية :** متوسط السمية (WHO Class II) .

* **قابلية المزج :** قابل للمزج مع معظم المبيدات

الحشرية والفطرية ماعدا القلوية منها .

* **فترة الأمان لجني المحصول :**

٣ أيام للقرعيات - ٧ أيام للتفاحيات والعنب .

* **ملاحظة :**

يجب عدم استخدام أكثر من ٢٠ سم ٣ من

المبيد في الدونم الواحد عندما يتم رش التفاحيات .

المحاصيل	المرض	نسبة الاستخدام
الخضراوات	لمكافحة البياض الدقيقي	٢ - ٤ سم ٣ / ٢٠ لتر ماء في الزراعات المكشوفة والمحمية
الحبوب	لمكافحة البياض الدقيقي والصدأ	٠,٥ لتر / هكتار
الأشجار المثمرة	لمكافحة البياض الدقيقي والصدأ	٤ - ٨ سم ٣ / ٢٠ لتر ماء
العنب ونباتات الزينة	لمكافحة البياض الدقيقي	٢ - ٤ سم ٣ / ٢٠ لتر ماء
التيغ	لمكافحة البياض الدقيقي	٢ - ٤ سم ٣ / ٢٠ لتر ماء

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس



كلوبيس

75 مسحوق قابل للبلل



- * **خصائص المبيد :** مبيد فطري غير جهاززي وله تأثير وقائي يعمل المبيد على إيقاف إنتاج الطاقة والغلوكوز في خلايا الفطور المنتشرة مما يؤدي لتوقف نموها وموتها كما يكافح مجموعة واسعة من الأمراض الفطرية على العديد من الأشجار المثمرة الكرمة - الخضار - المحاصيل الحقلية - الموز - التبغ - نباتات الزينة .
- * **التركيب ونسبة المادة الفعالة :** كلوروثالونيل ٧٥ % .
- * **السمية النباتية :** آمن على النبات إذا استخدم ضمن النسب المنصوح بها والمدونة على اللصاقة .
- * **التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية : (WHO Class III +)**
- * **من غير المحتمل حدوث أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوح بها .**

* **السمية للنحل والطيور والأسماك :**

خفيف للسمية للنحل والطيور سام للأسماك .

* **قابلية المزج :**

يمكن خلطه مع معظم المبيدات الفطرية والحشرية شائعة الاستعمال عدا القلوية منها (محلول بوردو) .

* **فترة الأمان لجني المحصول :**

التفاح - الأجاص - الدراق : ثلاث أسابيع .
الخوخ : ٣٥ يوماً . الخيار - البطيخ الأصفر
و الأحمر البطاطا البصل البندورة : أسبوعين .
* **الفترة بين الرشات : ١ - ٢ أسبوع .**

المحصول	المرض	معدل الاستخدام غ/ ١٠٠ لتر ماء
التفاحيات	الجرب - تفرح نكتاريا - ألترا ناربيا	١٥٠ - ٢٠٠
الدراق والخوخ	العفن الرمادي - تجعد الأوراق الدراق - مونيليا	
البندورة - الخيار	اللفحات - البياض الزغبي	
البطيخ الأحمر والأصفر	العفن الزيتوني - (كلادوسوريوم)	
نباتات الزينة	البياض الزغبي - سبتوريا	
أزهار القطف	الصدأ - ألترا ناربيا - أنتراكوز	١,٥ - ٢ كغ / هكتار
البصل	البياض الزغبي - العفن الرمادي	
البطاطا	اللفحة المبكرة والمتأخرة	
حمص - عدس	أسكوكتيا - أنتراكوز	
بازيلاء - فول	سبتوريا - العفن الرمادي	

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





غالستار

73 مسحوق قابل للبلل

* خصائص المبيد : مبيد فطري جهازى و بالملاسمة لمكافحة أمراض البياض الزغبي واللفحة المبكرة والمتأخرة وأمراض أخرى تصيب الكثير من المحاصيل يمتص بسرعة من قبل الساق و الأوراق وذلك خلال ٤ - ٥ ساعات .

* التركيب ونسبة المادة الفعالة : بينالاكسيل ٨٠ غرام / كغ . مانكوزيب ٦٥٠ غرام / كغ .

* التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية : (WHO Class III +) من غير المحتمل حدوث أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام الموصح بها .

* السمية النباتية : المبيد لا يسبب سمية نباتية وتحمله كافة المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .
* السمية للنحل والطيور والأسماك :

غير سام للنحل وغير سام نسبياً للطيور ومتوسط السمية للأسماك .

* قابلية المزج : ممكن مزجه مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية والعناكية ماعدا القلويسة منها مع إجراء تجربة خلط أولية .

* فترة الأمان لجني المحصول :

٢٧ يوم قبل الحصاد لكل المحاصيل .

المحصول	المرض	نسبة الاستخدام
الاعتماد المحلي بطاطا	اللفحة المبكرة Alternaria . SP	٣,٥ كغ / هـ
	اللفحة المتأخرة Phytophthora . SP	٥ كغ / هـ
البنندرة - الباذنجان القلقية	اللفحة المبكرة Alternaria . SP	٣,٥ كغ / هـ
	اللفحة المتأخرة Phytophthora . SP	٣,٥ كغ / هـ
الكرمة	البياض الزغبي Plasmopara . SP	٣٥٠ غ / ١٠٠ لتر ماء
اللوزيات - الدراق	تجعّد الأوراق Taphrina.SP	٨٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء ٤٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء
	لفحة المونيليا Monilinia.SP	٦٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





ستروبييل

50 حبيبات قابلة للبلل

- * خصائص المبيد : مبيد فطري مطور من مصادر طبيعية وهو ذو خصائص وقائية واستتصالية وعلاجية وذو فعالية قوية في مكافحة البياض الدقيقي والجرب على التفاحيات .
- * التركيب ونسبة المادة الفعالة : كريسوكسيم ميثيل ٥٠ % (وزن / وزن) .
- * السمية النباتية : المبيد لا يسبب سمية نباتية وتحمله كافة المحاصيل المذكورة في النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .
- * التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية (+ WHO Class III) من غير المحتمل حدوث أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوص بها .
- * السمية للنحل والطيور والأسماك : سام للأسماك غير سام للطيور والنحل .

- * قابلية المزج : قابل للمزج مع معظم المبيدات الحشرية و الفطرية ماعدا القلووية منها وذات القاعدة الكبريتية .
- * فترة الأمان لجني المحصول : يمكن جني المحصول بعد أسبوعين لكافة المحاصيل بعد الرش .

* ميزات المبيد :

- ١ - يبقى فعال لفترات طويلة .
- ٢ - انخفاض معدل الاستخدام .
- ٣ - له تأثير مبيد على المجموع الخضري للأشجار .
- ٤ - لا يتأثر بتساقط الأمطار .
- ٥ - يمكن استخدام المبيد خلال فترة الإزهار وهو جهازى موضعي على مستوى الأوراق .
- ٦ - له خاصية إختراقية حيث ينفذ من السطح العلوي للسطح السفلي للورقة .

المحصول	المرض	نسبة الاستخدام
الاعتماد المحلي	البياض الدقيقي / على العنب	٢٠٠ غ / هـ
التفاح	جرب التفاح - البياض الدقيقي	٢٠٠ غ / هكتار
الاجاص	جرب الاجاص	٢٠٠ غ / هكتار
اللوزيات	الجرب - البياض الدقيقي	٢٠٠ غ / هكتار
القرنيز	تبقع الأوراق - البياض الدقيقي	٢٠٠ غ / هكتار
الحمضيات	التبقع الأسود - الجرب - الانتراكوزا	٣٠٠ غ / هكتار
الكرمة	البياض الدقيقي - العفن الأسود - تماوت الافرع	٢٠٠ غ / هكتار
البازلاء	البياض الدقيقي	٢٠٠ - ٣٠٠ غ / هكتار
القرعيات	البياض الدقيقي	٢٠٠ - ٣٠٠ غ / هكتار
الجزر	البياض الدقيقي	٢٠٠ - ٣٠٠ غ / هكتار
البنندورة	لفحة الانترناريا	٣٠٠ - ٥٠٠ غ / هكتار
	اللفحة المبكرة - البياض الدقيقي	٣٠٠ - ٥٠٠ غ / هكتار

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





لورد

250 سائل مركز قابل للاستحلاب

* خصائص المبيد : مبيد فطري للقضاء على الأمراض الفطرية التي تصيب الأشجار المثمرة والمحاصيل

الحقلية والكرمة كما يمتاز بطريقة امتصاص النبات له بتأثيره على العامل الفطري المسبب للمرض ،

عن طريق دخوله ونفاذيته إلى داخل أنسجة النبات والقضاء على أبواغ الفطر المشكلة ويعمل على تثبيط مادة الستيرول في أغشية الخلايا مما يعني توقف نمو الفطر المصاب به النبات ومناسب لبرنامج مكافحة متكاملة لأن له سمية خفيفة على الحشرات النافعة .

* التركيب ونسبة المادة الفعالة : دافينوكونازول (٢٥٠ غرام في اللتر وزن / حجم) .

* السمية النباتية : المبيد لا يسبب سمية نباتية وتحمله جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها ،

لكن عند معالجة نبات القمح بمبيد لورد ٢٥٠، يجب أن يكون نبات القمح في مراحل الأطوار الكاملة من نموه .

* التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية : متوسط السمية (WHO Class II) .

* السمية للنحل والطيور والأسماك :

سام للأسماك وغير سام للطيور والنحل .

* قابلية المزج : قابل للمزج مع معظم المبيدات

الحشرية والفطرية ماعدا القلووية منها وذات القاعدة الكبريتية .

* فترة الأمان لجني المحصول : يمكن جني المحصول

للنخس والبندورة والبصل والثوم والقمح والشوندر

السكري بعد أسبوع من الرش للخيار بعد ٤ أيام ،

للأشجار المثمرة والعنب والجوز بعد أسبوعين .

نسبة الاستعمال	المرض	المحصول
٤٥ سم ٣ لكل ١٠٠ لتر ماء	لمكافحة اللبحة المبكرة وتبقع الأوراق . لمكافحة مرض التبقع . لمكافحة البياض الدقيقي والإنتراكونوز . لمكافحة تبقع الأوراق الأسود .	الحضراوات : البندورة - الخس الخيار الزهرة ، الملفوف
٣٠ - ٥٠ سم ٣ لكل ١٠٠ ل ماء	لمكافحة تبقع الأوراق والبياض الدقيقي . لمكافحة أمراض الأوراق . لمكافحة اللبحة Alternaria .	المحاصيل الحقلية : الشوندر السكري القمح - الجوز
٢٠ - ٣٠ سم ٣ لكل ١٠٠ ل ماء	لمكافحة أمراض التبقع (الجرب) والبياض الدقيقي والعفن الأسود والصدأ وتبقع الأوراق .	الأشجار المثمرة : الموز ، التفاح ، الأجاص العنب ، الكرز

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





80 حبيبات كبريت ميكرونية قابلة للإنتشار في الماء

- * **خصائص المبيد :** كبريت مكروني يستخدم كمبيد فطري وقائي للوقاية من الأمراض الفطرية .
- يرش على الخضراوات والأشجار المثمرة والحمضيات والعنب ونباتات الزينة .
- * **التركيب ونسبة المادة الفعالة :** كبريت ٨٠ ٪ وزن / وزن مواد حاملة وناشرة ٢٠ ٪ .
- * **السمية النباتية :** المبيد لايسبب سمية نباتية وتحمله جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها لكنه يجب الانتباه والاختبار على نطاق صغير بعض أصناف الاجاص والمشمش والليمون والكوسا تبدي حساسية للكبريت .
- * **السمية للنحل والطيور والأسماك :**
- سام للأسماك والنحل خفيف السمية للطيور . لا يرش في المناطق التي يوجد فيها خلايا نحل .
- * **التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية :** (WHO Class III)
- من غير المحتمل حدوث أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوص بها .

المحاصيل	الآفة	معدل استخدام / لكل ١٠٠ لتر ماء
الخضراوات	البياض الدقيقي العناكب (الحلم)	٢٠٠ - ٣٠٠ غ ٣٠٠ - ٥٠٠ غ
القرعيات	البياض الدقيقي العناكب (الحلم)	٢٠٠ - ٣٠٠ غ ٣٠٠ - ٥٠٠ غ
الخجوب	البياض الدقيقي	٢٠٠ - ٣٠٠ غ
الحمضيات	العناكب (الحلم)	٣٠٠ - ٥٠٠ غ
العنب	البياض الدقيقي العناكب (الحلم)	٢٠٠ - ٣٠٠ غ ٣٠٠ - ٥٠٠ غ
نباتات الزينة	البياض الدقيقي	٢٠٠ - ٣٠٠ غ

- * **قابلية المزج** : قابل للمزج مع بعض المبيدات الحشرية والفطرية لكن يجب إجراء اختبار على نطاق صغير قبل عملية المزج .
لايختلط مع المواد ذات القلوية العالية .
لايختلط مع الزيوت ولايرش قبلها ولا بعدها .
* **فترة الأمان لحي المحصول** :
يمكن جني المحصول بعد ٣ أيام للخضراوات - ١٥ يوم للكرمة .
٧ أيام للنشائيات والبازلاء
المحاصيل ١٠ - ١٥ يوم .

المبيدات الفطرية

انتاج الشركة الحديثة لوقاية المزارعين أغرى بيس





سولفين داست

95 مسحوق ناعم للتغفير

* **خصائص المبيد :** كبريت زراعي مسحوق ناعم للتغفير .

مبيد فطري وقائي غير جهاززي للوقاية من البياض الدقيقي والجرب له تأثير ثانوي على العناكب والحلم يقضي على العناكب الحمراء في العديد من المحاصيل و على الأشجار المثمرة و الخضار .

* **التركيب ونسبة المادة الفعالة :**

كبريت ٩٥ ٪ وزن / وزن . مواد حاملة ٥ ٪ .

* **التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية : (WHO Class III +)**

من غير المحتمل حدوث أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوح بها .

* **السمية النباتية :**

تبدي بعض أصناف المشمش والأجاص و القرعيات و الكرمة حساسية تجاه الكبريت لذلك يفضل عمل تجربة صغيرة قبل الرش .

* **السمية للنحل والطيور والأسماك :**

غير سام للنحل والطيور والأسماك ولا يسبب أي أضرار للبيئة .

* **فترة الأمان لجني المحصول :**

عشرة أيام لكافة الماصيل المذكورة .

معدل الاستخدام لكل واحد هكتار	الآفة	المحاصيل
٢٥ - ٣٥ كغ	البياض الدقيقي	بندورة - بطيخ خيار - بصل ملفوف - كوسا جزر
٢٥ - ٣٥ كغ	البياض الدقيقي العناكب	العنب التفاح اللوزيات
٢٥ - ٣٥ كغ	البياض الدقيقي العناكب	القمح الشعير الذرة
٠,٥ كغ / شجرة	العناكب	النخيل

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





أغري غولد

480 مستحلب مركز

* خصائص المبيد : مبيد فطري جهازى ذو أثر متبقى يقضى على الفطريات المتواجدة في التربة مثل أنواع بيشوم وفيتوفورا والتي تصيب المحاصيل النباتية المختلفة .

* التركيب ونسبة المادة الفعالة : ميتالاكسيل - م - ٤٨٠ غ / ل .

* المجموعة الكيميائية : أميلالانين .

* السمية النباتية : المبيد لا يسبب سمية نباتية وتحمله جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .

* السمية للنحل والطيور والأسماك :

خفيف السمية للأسماك وللنحل والطيور .

* التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية :

(WHO Class III +) من غير المحتمل حدوث

أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوح بها .

* قابلية المزج : قابل للمزج مع معظم المبيدات الحشرية

والفطرية ما عدا الفلوية منها وذات القاعدة الكبريتية .

* فترة الأمان لجني المحصول : الفريز ١٤ يوم .

التفاحيات ٤٢ يوم - الحماضيات ٢٨ يوم .

اللوزيات - الخضار - القطن - التبغ

نباتات الزينة لا يوجد .

المحصول	المرض	معدل الاستخدام	الاستعمال
التوزيات	تعفن الجذور تعفن الساق	١ مل / ٢٠ سم شجر صغير حتى عمر ٣ سنوات ١,٢-٢,٥ مل / ٢٠ سم شجر متنوع أكثر من ٣ سنوات	٣ مرات / سنة حول الساق وعند الجذور ٢ مرة / سنة حول الساق وعند الجذور
التفاحيات	تعفن الرقبة	١ مل / شجرة غير المثمرة	مرة قبل الإزهار في الربيع والغري في الخريف حول الساق
الحماضيات	تسرع الحماضيات تعفن القدم تعفن الجذور الفرج الساق	١ مل / ٢٠ سم شجر صغير حتى عمر ٣ سنوات ١,٢-٢,٥ مل / ٢٠ سم شجر متنوع أكثر من ٣ سنوات	سقاية حول الساق مرتين تسيل الأولى موسم الأمطار بكر بعد ٣-٦ أشهر
الفريز	عفن اللب الأحمر وعفن الريزومات	١٠,٥-٣,٧٥ ل / هـ	مرتين في الموسم الأولى قبل الإزهار على خطوط يسقى بعد المعالجة لمدة ٥ دقائق
القطن	أعطان الديدان و أمراض الشوغل (سقوط البادرات)	١,٥-٣ مل / ١٠٠ متر بالسطر	برش القطن قبل تعظية البذور
الفلينغلة البادرات	عفن الجذور و الحاج (سقوط البادرات)	١ لتر / هـ قبل الإزهار ٢ لتر / هـ بعد الإزهار	يستخدم ٣-٤ مرات حول البادرات وبعض ٣٠ سم الإضافة الثانية ٢١-٢٨ يوم من البشيل يضاف ويخلط مع التربة السطحية
التبغ	مرض الساق الأسود العفن الأزرق	١-٢ لتر / هـ (معالجة وحيدة)	سقاية التربة قبل البشيل حيث يخلط في التربة ويستعمل المعدل الأعلى للأعلاف القائمة أو نصف المقدار يستعمل سقاية قبل و حتى مرحلة البشيل تكرر المعاملة بمعدل ١-٢ لتر / هـ بعد ٤-٥ أسابيع
المرج الأخضر	اصفرار سقوط بادرات باض زغبي - للحة	١-٢,٥ لتر / هـ	حاج مائدة بعد وضع البادرات وتعمل ٣ مرات للتوسم الحد الأعلى للكرشات ٣ مرات وعلى تطور مراحل المرض
بادرات التربة	عفن الجذور عفن الساق ذبول البادرات	على أوضاع التربة : ١٢,٥-١٢,٥ مل / ٣٠ م ١٠-١٥ لتر ماء . سقاية من : ١٢,٥-١٢,٥ مل / ١٠٠ لتر ماء . الأضار : ٢-٢,٥ مل / ١٠٠ لتر ماء . اللوب : ١٢,٥ مل / ١٠٠ لتر ماء . السوس : على الأقدام ١ لتر / هـ	
الاعتماد المحلي	تسرع الحماضيات (علاجي على الحماضيات	١ مل / ٢٠ سم شجر صغير ٢,٥ مل / ٢٠ سم شجر أكثر من ٣ سنوات	

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





برينس

حبيبات قابلة للانتشار في الماء

* خصائص المبيد : مبيد فطري يكافح اللقحة المبكرة والمتأخرة والبياض الزغبي .

طريقة التأثير : موضعي واختياري يتكون من مادتين فعاليتين :

١ - سايوكسانيل . لها مفعول علاجي . ٢ - فاموكسودون . لها مفعول وقائي .

* التركيب ونسبة المادة الفعالة : سايوكسانيل ٣٠ ٪ . فاموكسودون ٢٢,٥ ٪ .

* السمية النباتية : المبيد لايسبب سمية نباتية حتى لو استخدم بضعف الجرعة الموصى بها وتتحمله جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .

* السمية للنحل والطيور والأسماك : سام للأسماك , غير سام للنحل والطيور .

* التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية : خفيف السمية (WHO Class III) .

* قابلية المزج : قابل للمزج مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية ما عدا القلويسة منها وذات القاعدة الكريتيية .

* فترة الأمان لجني المحصول : للعب ٢٨ يوما . للببطا : ١٤ يوم . بندورة والخس و القرعيات ٣ أيام .

* الفترة بين الرشاش : ١٠-١٢ يوما . في حال هطول أمطار أو ظهور إصابة : تصبح الفترة بين الرشاش ٧-٨ يوما .

* ملاحظة : يجب رشه في مراحل مبكرة لنمو المحصول قبل بدء ظهور أعراض المرض في الحقل .

* الاعتماد المحلي :

لمكافحة اللقحة المتأخرة على البطاطا

وقائياً بمعدل ١,٤ كغ / هـ .

معدل استخدام	الآفة	المحاصيل
٤٠ غ / ١٠٠ لتر ماء	اللقحة المبكرة والمتأخرة	البطاطا
	البياض الزغبي و اللقحات	البندورة القرعيات الخس
	البياض الزغبي	العنب

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





رودكس فورت

250 مركز معلق

- * خصائص المبيد : مبيد فطري جهاززي فعال وقائي وعلاجي للسيطرة على مجموعة واسعة من الأمراض الفطرية على الخضراوات والمحاصيل وأشجار الفاكهة سريع التفكك لذا هو آمن على البيئة ويستخدم في برامج IPM يعمل على منع إنبات الأبواغ و نمو المسيليوم .
- * التركيب ونسبة المادة الفعالة : ازوكسي ستروبين ٢٥٠ غ / ل (وزن / حجم) .
- * السمية النباتية : المبيد لا يسبب سمية نباتية وتحملله جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .
- * التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية : (+ WHO Class III) من غير المحتمل حدوث أي تسمم ضمن معدلات

الاستخدام المنصوح بها .

* السمية للنحل والطيور والأسماك :

غير سام للنحل وخفيف السمية للطيور
و سام للأسماك .

* قابلية المزج : قابل للمزج مع معظم المبيدات

الحشرية والفطرية ، ما عدا القلووية منها .

* فترة الأمان لجني المحصول :

محاصيل الحبوب ٣٥ - ٤٠ يوم .

محاصيل الخضراوات يوم واحد العنب

و البطاطا وأشجار الفاكهة أسبوعان .

معدل الاستخدام	المرض	المحاصيل
١ ل / هكتار	اللفحة المتأخرة على البطاطا	الاعتماد المحلي
٨٠٠ مل / هكتار	البياض الزغبي	العنب
٥٠ - ١٠٠ مل / ١٠٠ ل ماء	اللفحة المبكرة اللفحة المتأخرة	بندورة , بطاطا
٥٠ - ٨٠ مل / ١٠٠ ل ماء ٧٥ مل / ١٠٠ ل ماء	البياض الزغبي الخيار في البيوت المحمية	خيار , كوسا , بطيخ (أحر - أصفر) قرع
٠,٥ - ٠,٧٥ ل / هكتار	البياض الزغبي	خضراوات
٨٠٠ مل / هكتار	تبقع الأوراق (هيلمنثوسوريوم)	الحبوب
٠,٨ - ١ لتر / هكتار	البياض الزغبي الاثرنايا	التبغ

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس



ميداكس

77 مسحوق قابل للبلل



* خصائص المبيد : مبيد نحاسي غير عضوي له تأثير وكفاءة كبيرة في مكافحة مجموعة واسعة من الأمراض الفطرية التي تصيب الخضراوات والزيوت والعنب وأشجار الفاكهة ونباتات الزينة كما أنه له تأثير على بعض الأمراض البكتيرية .

* التركيب ونسبة المادة الفعالة : هيدروكسيد النحاس ٧٧٪ (مايعادل ٥٠٪ نحاس صافي) .

* السمية النباتية : المبيد لا يسبب سمية نباتية وتحملة جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف

ونسب الاستخدام الموصى بها .

* السمية للنحل والطيور والأسماك : سام للأسماك .

متوسط السمية للطيور غير سام للنحل .

* التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية :

خفيف السمية (WHO Class III) .

* قابلية المزج : قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية

والفطرية ما عدا القلوية منها ، وذات القاعدة الكبريتية .

* فترة ما قبل الجني : التفاحيات والزيتون ثلاثة أسابيع

الحضار والخمضيات أسبوع واحد العنب اسبوعان .

ملاحظة :

١ - عند الرش يجب تغطية كافة أجزاء المجموع الخضري .

٢ - تجنب استعماله في فترة الأزهار .

٣ - بعض أصناف الدراق حساسة للنحاس بعد ظهور الأوراق .

٤ - يمكن أن يحصل ضرر طفيف لأوراق الدراق والكزبر .

٥ - يمكن أن يسبب ضرر طفيف لبعض أصناف التفاح والأجاص .

* ملاحظات الأجاص : يرش من بداية الإزهار مرتين .

١ - قبل هطول المطر .

٢ - قبل بدء النمو في الربيع .

ملاحظة : زيادة معدل الاستخدام يمكن أن يسبب تلون صدي للثمار .

* التفاح : يمكن أن يسبب تغير في لون التفاح الأصفر ينصح

بالرش بعد القطف .

ملاحظة : لا يرش النباتات بشكل متاخر .

* فترة الأمان : يصبح بعدم دخول الحقول المعاملة في

المبيد قبل مضي ٤٨ ساعة على عملية الرش .

المحصول	المسرى	معدل الاستعمال
الحبار	تبلغ الأوراق البياض الزغبي (وقلنا)	١,٥ - ٢ / كغ / هكتار
الباذنجان	لفحة التبرازيا ، الأنتراكوز ، عفن فوموسيس	١,٥ - ٢ / كغ / هكتار
البندورة	عفن الأوراق الرمادي ، اللقحة المبكرة ، تلغ سبوريا ، الأنتراكوز	١,٥ - ٣ / كغ / هكتار
الصل	المنطق الأجواني ، البياض الزغبي (وقلنا)	١,٥ - ٢ / كغ / هكتار
الحس	البياض الزغبي (وقلنا)	١,٥ - ٢ / كغ / هكتار
الطبخ	البياض الزغبي (وقلنا) ، الأنتراكوز	١,٥ - ٣ / كغ / هكتار
المنقرف	العفن الأسود ، لقحة التبرازيا ، البياض الزغبي (وقلنا)	١,٥ - ٢ / كغ / هكتار
البطاطا	اللقحة المبكرة و اللقحة المتأخرة	١,٥ - ٢ / كغ / هكتار
السبانج	الأنتراكوز ، الصدأ الأبيض ، البياض الزغبي (وقلنا)	١,٥ - ٢ / كغ / هكتار
الشمش	تلغن الأزهار ، النطب الحرقفي	٩ - ١٢ / كغ / هكتار
	النطب الحرقفي ، لجعد الأوراق	٩ - ١٦ / كغ / هكتار
الدراق	لقحة تلغن الأزهار	٩ - ١٢ / كغ / هكتار
	الشفق الكتيزي	٧ - ٨ / كغ / هكتار
الزيتون	مرض تلغن عن الطائوس	٩ - ١٢ / كغ / هكتار
الأجاص	اللقحة الماريا	٥ - ١٠ / كغ / هكتار
	لقحة سيد وموناس	١٢ - ١٦ / كغ / هكتار
العنب	الشفق الأسود ، البياض الزغبي (وقلنا)	١ - ٢ / كغ / هكتار
	لقحة تلغن الأزهار	١,٥ - ٣ / كغ / هكتار
التفاح	الأنتراكوز ، الفرج الأوروي	١٢ - ١٦ / كغ / هكتار
	اللقحة الماريا	٩ - ١٦ / كغ / هكتار
الخمضيات	الحرب	٥ - ١٢ / كغ / هكتار
الشوندر السكري	تلغن سركسورا على الأوراق	٢,٥ - ٥ / كغ / هكتار
نباتات الزينة	تلغن سركسورا على الأوراق ، تلغن سبوريا على الأوراق عفن بوتريتيس ، لقحة التبرازيا ، الشفق الأسود ، الأنتراكوز	١٠ / ١٢ لتر ماء
القمح والشعير	تلغن سبوريا على الأوراق ، لقحة هلمتوسوريوم	١,٥ - ٢ / كغ / هكتار

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





كاربين

800 بودرة قابلة للبلل

* **خصائص المبيد:** مبيد فطري وقائي يعمل بالملازمة يستخدم وقائياً ضد مجموعة كبيرة من الأمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة والخضراوات ونباتات الزينة حيث يعمل على وقاية هذه المحاصيل من الأمراض الفطرية ولفترة تصل حتى ١٥ يوم .

* **التركيب ونسبة المادة الفعالة:** مانكوزيب ٨٠٠ غ / كغ .

* **السمية النباتية:** المبيد لا يسبب سمية نباتية وتحمله جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .

* **السمية للنحل والطيور والأسماك:** المبيد غير سام نسبياً للطيور والنحل متوسط السمية للأسماك .

* **التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية:** (WHO Class III +)

من غير المحتمل حدوث أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوح بها .

* **قابلية المزج:** قابل للمزج مع معظم المبيدات شائعة الاستخدام وحتى مع المواد اللاصقة لا يخلط مع المبيدات القلووية مثل محلول بوردو وذات القاعدة الكبريتية .

* **فترة الأمان لجني المحصول:**

٢١ يوم على كافة المحاصيل .

* **معدلات الاستخدام:**

في المشتل: ٨٥ - ١٣٠ غ / ١٠٠ لتر ماء

ترش النباتات كل ٣ - ٤ أيام .

في الحقل: ١٧٥ غ / ١٠٠ لتر ماء مرتين

أسبوعياً عندما تكون الظروف مشجعة للإصابة .

* **الاعتماد المحلي:** لمكافحة البياض الزغبي

على الخيار في الزراعات المحمية

كمبيد وقائي بمعدل ٢٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء .

المحصول	المرض	معدل الاستخدام لكل ١٠٠ لتر ماء
التفاح	جرب التفاح التثقب الحرقفي	٢٠٠ - ٣٠٠ غ
الكرمة البطاطا البندورة	البياض الزغبي اللفحة المبكرة والمتأخرة اللفحة المبكرة والمتأخرة تبقعات الأوراق والانتراكنوز	٢٠٠ - ٣٠٠ غ ٢٠٠ غ ٢٠٠ غ ٢٠٠ غ
البصل القرعيات التبغ	البياض الزغبي البياض الزغبي العفن الأزرق	٢٠٠ غ

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس



بيس مان

400 مركز معلق



- **خصائص المبيد :** مبيد فطري متخصص في مكافحة اللفحات المبكرة والمتأخرة والبيض الزغبي على أشجار الفاكهة والخضراوات والعنب .
- **التركيب ونسبة المادة الفعالة :** سيازوفاميد ٤٠٠ غ / ل .
- **السمية النباتية :** المبيد لا يسبب سمية نباتية وتحمله جمع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .
- **السمية للنحل والطيور والأسماك :** المبيد خفيف السمية للنحل وسام للطيور وخفيف السمية للأسماك .
- **التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية : (WHO Class III +)**
- من غير المحتمل حدوث أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوح بها .
- **قابلية المزج :** يمكن خلطه مع المبيدات الحشرية وزيت الرش حيث يفضل إجراء تجربة على نطاق ضيق قبل استخدامه بشكل واسع .
- لا يوجد له أي سمية نباتية .
- **فترة الأمان لجني المحصول :** يمكن جني المحصول بعد ٧ يوم من الرش لمعظم المحاصيل .
- **طريقة عمل المبيد :** يعمل عبر وقف عملية التنفس في الموقع العقد الثالث في الميتوكوندريا وهي طريقة تأثير جديدة مختلفة من حيث موقع التأثير عن المبيدات الفطرية الأخرى . فاعل بشكل قوي على اللفحات والبيض الزغبي إضافة إلى تأثيره القوي على فطريات البشوم .
- يؤثر على الفطر خلال جميع مراحل تطوره .
- **ميزات المبيد :** له القدرة على مقاومة الغسيل الناجم عن مياه الأمطار حتى لو هطلت أثناء الرش أو بعده خلال ١٥ دقيقة .
- يحمي الدرنات من أمراض اللفحات .
- متوافق مع برامج مكافحة التكاثر كونه آمن على الحشرات النافعة .
- يكافح السلالات المقاومة التي شكلت مناعة للمبيدات الأخرى .
- **الاعتماد المحلي :** البيض الزغبي على الخيار (علاجي) ٢٠٠ مل / هكتار .

المحصول	المرض	معدل الاستخدام
البطاطا البنندورة الفليلة	اللفحة المتأخرة اللفحة المبكرة	٢٠٠ مل للهكتار
القرعيات	البيض الزغبي	

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس



لاتكس

85 بودرة قابل للبلل



* **خصائص المبيد :** مبيد فطري نحاسي وقائي غير عضوي و يكافح مجموعة واسعة من الأمراض الفطرية التي تصيب الخضراوات والزيتون والعنب وأشجار الفاكهة ونباتات الزينة كما أن له تأثيراً وقائياً على بعض الأمراض البكتيرية .

* **التركيب ونسبة المادة الفعالة :**

اوكسي كلور النحاس ٨٥ ٪ (ما يعادل ٥٠ ٪ نحاس صافي) .

* **السمية النباتية :** يجب أخذ الحيلة ونظراً للسمية النباتية للنحاس خاصة وفي المناطق الباردة والرطبة على الأصناف الحساسة من أشجار الفاكهة مثل الكرومة والمحاصيل الأخرى .

* **قد يسبب قشع على بعض أصناف التفاح والإجاص .**
* **تجنب الرش أثناء فترة الإزهار .**

* **بعض أصناف الدراق والوخوخ تبدي حساسية لذا يفضل إجراء تجربة صغيرة قبل التعميم على كامل البستان .**
* **السمية للنحل والطيور والأسماك :**

سام للأسماك . خفيف السمية للطيور وللنحل .

* **التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية :**
خفيف السمية (WHO Class III) .

* **قابلية المزج :** قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية ماعدا المبيدات ذات الأحماض المرتفعة يجب استخدام المحلول فوراً ولا يخلط مع التيرام - الكبريت .
* **فترة الأمان لجني المحصول :** ١٥ يوم .

معدل الاستخدام لكل ١٠٠ لتر ماء	المرض	موعد الاستخدام	المحصول
٤٠٠ - ٥٠٠ غ	اللفحة المبكرة والمتأخرة تبقع الأوراق	عند توقع ظهور الإصابة	البطاطا
٤٠٠ - ٥٠٠ غ ٢٠٠ - ٣٠٠ غ ٥٠٠ غ	جرب الحمضيات العفن البني ميلانوز	في مرحلة السكون	الحمضيات
٤٠٠ - ٦٠٠ غ	اللفحة المبكرة والمتأخرة تبقع سيترويدي	عند توقع ظهور الإصابة وبعد هطول الأمطار	البنندوره
٥٠٠ غ	عين الطاووس ، تبقع انتراكوز التبقع البكتيري	قبل الأمطار وفي الربيع	الزيتون
٣٠٠ غ ٥٠٠ غ	اللفحة النارية التبقع البكتيري	رش في الشتاء	اللوزيات
٣٠٠ غ	الجرب ، انتراكوز اللفحة البكتيرية	قبل الموسم	التفاحيات
٥٠٠ غ	البياض الزغبي	رش في الشتاء رش بعد الإزهار	العنب

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس



بولك

80 مسحوق قابل للبلل



* خصائص المبيد : مبيد فطري غير جهازى وقائى وعلاجى واسع الطيف لمكافحة مجموعة من الأمراض الفطرية على الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية والخضراوات المختلفة ويستخدم للرش على الثمار بعد القطف للوقاية من أمراض التخزين .

* التركيب ونسبة المادة الفعالة :

يحتوي على ٨٠ ٪ من مادة كابتان .

* السمية النباتية : المبيد لا يسبب سمية نباتية وتحملة

جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة

تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .

لكن بعض أصناف التفاح (بريلي - مونارش - ريد بلاش)

والخوخ (دانجو) تبدي حساسية

للمادة يجب إجراء تجربة صغيرة قبل الرش .

* السمية للنحل والطيور والأسماك :

غير سام للطيور والنحل و سام للأسماك ، حار للأعداء الحيوية .

* التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية :

(WHO Class III +) من غير المحتمل حدوث

أي تسمم ضمن معدلات الاستخدام المنصوح بها .

* قابلية المزج : قابل للمزج مع معظم المبيدات

الحشرية والفطرية ، ماعدا القلووية منها ، والزيوت .

لا يخلط مع مزيج بورديو والكبريت الكلسي لانه

غير ثابت تحت الظروف القلوية الشديدة .

قبل رش خليط المبيد مع المبيدات الاخرى

يجب اجراء تجربة على نطاق ضيق .

المحصول	المرض	معدل الاستعمال ١٠٠ لتر ماء	فترة ما قبل الجني	ملاحظات
الفواحيات	جرب التفاح والأجاص	١٢٠ غ	٢١ يوم	يعاد الرش تبعاً للحاجة بفواصل ٥-٧ أيام
اللوزيات	عفن مونيليا، عفن الرمادي تجعّد أوراق الدراق	١٧٥ غ	١٤ يوم	في مرحلة الرعم الاخر والاظهار وعند سقوط ٧٥ ٪ من البلات
الفرعيات	البياض الزغبي	١٥٠-٢٥٠ غ	١٤ يوم	يبدأ الرش مع بداية العلام الأولى للمرض بفواصل زمني ٧-١٤ يوم بين كل رشة واخرى
البندورة	لفحة مبكرة	٣٠٠ غ	١٤ يوم	يبدأ الرش مع بداية العلام الأولى للمرض بفواصل زمني ١٤ يوم بين كل رشة واخرى
العنب	البياض الزغبي	١٢٥ غ	٢٨ يوم	الرش عندما تكون الظروف بطول (٣-١ سم (١٢-٦) سم (٢٠-٣٠) سم
أمراض التخزين	أمراض العفن بعد القطف	١٨٠ غ		تغطس الثمار قبل التخزين بالحلول المعد من المبيد

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





دو ريمكس

حبيبات قابلة للبلل

خصائص المبيد : مبيد فطري جهاززي وقائي علاجي لمكافحة طيف واسع من الأمراض الفطرية يحتوي على مادتين فعاليتين جديدتان وهي مواد فعالة ذات طبيعة عمل فريدة ومتميزة في تأثيرها له تأثير قوي

حيث يقاوم المسببات المرضية على عدد كبير من المحاصيل الزراعية مثل :

البياض الدقيقي ، البياض الزغبي ، أعفان الثمار ، بقعات الأوراق ، اللفحات المبكرة والمتأخرة .

التركيب ونسبة المادة الفعالة : بوسكاليد ٢٥,٢ ٪ + بيروكلورستروبين ١٢,٨ ٪ (وزن / وزن) .

السمية النباتية : المبيد لا يسبب سمية نباتية وتشملة جميع المحاصيل المذكورة في هذه

النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها . لا يستعمل على فول الصويا ، اللوبيه ، حقول البازلاء

الرمس ، الشندر السكري ، اللث ، الفجل إلا بعد التجربة . السمية للنحل والطيور والأسماك :

غير سام للنحل والطيور وسام جداً للأسماك . التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية :

خفيف السمية (WHO Class III) ، قابلة المزج : قابل للمزج مع معظم المبيدات

الحشرية والفطرية ما عدا القلوية منها وذات القاعدة الكبريتية . طريقة التأثير : دو ريمكس يبط الإنزيمات المسؤولة

عن عملية الاختزال التي تحدث في الميتوكوندريا . الاعتماد المحلي :

لمكافحة البياض الدقيقي على الخيار في البيوت المحمية (علاجي) ٣٠ غ / ١٠٠ لتر ماء .

المحصول	الآفة	معدل الاستخدام ١٠٠ لتر ماء	فترة ما قبل الحصاد
العنب	البياض الزغبي - أعفان الثمار والبياض الدقيقي	٥٠ غ	١٤ يوم
التفاح - الأجاص	البياض الدقيقي والجرب البياض الدقيقي ولفحة الأزهار	٣٠ غ ٥٠ غ	٧ أيام ١٤ يوم
اللوزيات	أعفان ثمار (عفن السرة) - موت الأطراف	٥٠ غ	١٤ يوم
القرعيات	البياض الدقيقي البياض الزغبي - لفحة الساق الصمغية	٣٠ غ ٥٠ غ	٣ أيام
الفريز	أعفان الثمار - البياض الدقيقي - بقعات الأوراق	٥٠ غ	٣ أيام
البندورة - البطاطا	اللفحات المبكرة والمتأخرة	٧٥ غ	٣ أيام
البندورة - الباذنجان	البياض الدقيقي - أعفان ثمار	٥٠ غ	٣ أيام
البصل والثوم	بياض الزغبي - اللفحة الأوجوانية - اصداء	٥٠ غ	٧ أيام
البقوليات - بازلاء فاصوليا - فول	التبقع البني وعفن القرون والجذور بقعات الأوراق - الصدأ	٥٠ غ	٣ أيام
نباتات الزينة	البياض الدقيقي - الصدأ	٣٠ غ	صفر
الشندر السكري	تبقع الأوراق السركسوري	٥٠ غ	صفر

المبيدات الفطرية



أغريت بلس

80 حبيبات قابلة للبلل

* خصائص المبيد : مبيد فطري جهازي يمتص عن طريق الأوراق والجذور متخصص لمكافحة الأمراض الفطرية والبيض الزغبي واللحة النارية على الأشجار المثمرة والحمضيات والقرنيز والكرمة والخضار.

* التركيب ونسبة المادة الفعالة : فوسيتيل الألومنيوم ٨٠ ٪ (وزن / وزن) .

* السمية للنبات : المبيد لايسبب سمية نباتية وتحمله جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها .

* التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية : (WHO class III) خفيف السمية .

* السمية للنحل والطيور والأسماك : خفيف السمية للنحل والطيور والأسماك .

* مجالات ونسب الاستعمال :

* الحمضيات : لمكافحة التصدغ - التفرح يستعمل بمعدل ٥ - ١٠ كغ / هكتار .

* مشاتل الحمضيات : لمكافحة ذبول البادرات يستعمل بمعدل ٨٠ غ لكل تنكه ماء .

* أشجار الفاكهة : لمكافحة عفن الساق يستعمل بمعدل ٥٠ غ لكل تنكه ماء ويعالج مرة واحدة كل شهر خلال النمو .

* الخضراوات : (قرع - خيار - بطيخ - بصل) لمكافحة البياض الزغبي بمعدل ٣٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء .

* الاعتماد المحلي : البياض الزغبي (علاجي) على الخيار ٣٠٠ غ / ١٠٠ لتر ماء .

* فترة الأمان لجني المحصول : يمكن جني المحصول بعد سبعة أيام من الرش .

* قابلية المزج : قابل للمزج مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية ماعدا القلووية منها لكن لا ينصح بمزجه مع الأسمدة الورقية والمغذيات والمنتجات التي تحتوي على مادة النحاس ولا يمكن استخدامه مع المركبات الزيتية .

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





تروى

60 معلق مركز لتعقيم البذار

- * خصائص المبيد : معقم بذار جهازي يكافح العديد من الأمراض الفطرية بكفاءة عالية مثل التفحم في الحبوب كذلك تعقم البذور سيتوريا و أيضا في محصول السورجوم و الذرة .
- * التركيب ونسبة المادة الفعالة : تيبكونازول ٦٠ غ / ل .
- * المجموعة الكيميائية : مركبات التريازول .
- * السمية النباتية : المبيد لا يسبب سمية نباتية وتحمله جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام المصى بها .

المحصول	معدل استخدام	المرض
القمح	٥٠ مل / ١٠٠ كغ بذور	التفحم المغطى والسائب في القمح (<i>Tilletia . spp</i>) (<i>Ustilago . spp</i>)
الشعير	٥٠ مل / ١٠٠ كغ بذور	التفحم المغطى والسائب في الشعير (<i>Tilletia . spp</i>) (<i>Ustilago . spp</i>)
القمح	٥٠ مل / ١٠٠ كغ بذور	التبقع السيتوري في القمح (<i>Septoria . spp</i>)
التيغ	١٣٠-١٦٠ مل/كغ بذور	مرض تفحم الرأس (<i>Sphacelotheca reiliana</i>)
الذرة الصفراء	١٣٠-١٦٠ مل/كغ بذور	مرض تفحم الرأس (<i>Sphacelotheca reiliana</i>)

- * التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية : متوسط السمية (WHO Class II) .
- * السمية للنحل والطيور والأسماك : متوسط السمية للنحل والطيور والأسماك .
- * قابلية المزج : ينصح بعدم خلطه مع المبيدات أخرى .
- * طريقة التأثير : مبيد جهازي علاجي و وقائي يعمل تيبكونازول على تثبيط تكوين الإسيترول داخل الفطر عن طريق نزع مجموعة الميثيل (DMI) .
- * ملاحظة : لا تستعمل البذور المعاملة كطعام الإنسان أو الحيوان ولا تخلط مع بذور غير المعاملة .

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس



كورال

50 حبيبات قابلة للانتشار في الماء



- * خصائص المبيد: مبيد فطري جهازي ذو طريقة تأثير فعالة وحديثة على العوامل الممرضة كونياليا الأزهار (لفحة الأزهار) ومونياليا الثمار (عفن الثمار) والجرب التي تصيب أشجار التفاحيات واللوزيات والخضراوات بالإضافة لمرض العفن الرمادي (البوترائيس) على الكرمة والخضار واللفحة المبكرة على البطاطا ولفحة الأسكويتا على الخضراوات والبقوليات
- * التركيب ونسبة المادة الفعالة : مسايرودينيل ٥٠ ٪ (وزن / وزن) .
- * الخصائص وطريقة عمل المبيد : مبيد جهازي يقوم كورال بمهاجمة المرض من ثلاثة مواقع :
1 - إيقاف نمو المصاصات . 2 - إيقاف اختراق الفطر إلى داخل النبات . 3 - إيقاف نمو الميسيليوم داخل خلايا النبات . وبذلك يحمي كورال أوراق وثمار النباتات بسبب عمله الجهازى داخل أوراق وثمار النبات وخواصه الانتقالية السريعة داخل الأنسجة النباتية .
- * السمية النباتية : المبيد لا يسبب سمية نباتية وتحمله كافة المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب الاستخدام الموصى بها ، عدا بعض أصناف الدراق والأجاص .
- * التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية : (WHO class III +) . من غير المحتمل حدوث أي أضرار ضمن معدلات الاستخدام المنصوص بها .
- * السمية : الجرعة النصفية القاتلة LD50 لأنثى الجرذ عن طريق الفم والجلد : أكثر من ٢٠٠٠ ملغم/كغم .
- * السمية للحل وللطيور والأسماك : خفيف السمية للطيور والنحل متوسط السمية للأسماك .
- * فترة ما قبل الجني : اللوزيات 14 يوم - الكرمة 28 يوم - البقول 42 يوم .

* **قابلية المزج :** كورال قابل للمزج مع معظم المبيدات الفطرية الهامة المستعملة والمتواجدة في الأسواق .
عند الشك ينصح بإجراء اختبار قابلية المزج .

* **ظاهرة المقاومة :** بسبب احتواء كورال على مادة حديثة جهازية (السايرودينيل 50 ٪) فإنه من غير المتوقع حدوث أعراض مقاومة على النباتات المعالجة بكورال وعموماً ينصح بالتبديل باستعمال المبيدات الفطرية مختلفة الزمرة الكيميائية إذا ما تجاوز الرش أكثر من 3 رشات في الموسم .

عند خلط مبيد الكورال مع مبيدات أخرى في عزان الرش يجب مراعاة الترتيب التالي :
كورال أولاً ثم المبيدات الأخرى المراد خلطها معه ،
أما في حال كون المبيدات الأخرى موضوعة في أكياس قابلة للذوبان أضفها أولاً للماء ثم أضف الكورال .

المحصول	المرض	نسبة الاستخدام ١٠٠ ل ماء	عدد الرشات	الفترة بين الرشتين بالأيام	توقيت الرش
التفاحيات التفاح	مونياليا الأزهار (لفحة الأزهار)	٢٠٠ غ	٢	٧ - ١٠ أيام	من بداية فترة الإزهار وينصح بالتبكير للحصول على الفعالية القصوى
	الجرب علاجي	٥٠ غ	٣ - ٤	٧ - ١٠ أيام	بعد ١ إلى ٢ يوم من الإصابة إلى ما بعد فترة الإزهار
اللوزيات	تبقع الأوراق	١٥٠ غ	١ - ٢	٧ - ١٠ أيام	بعد الإزهار
	مونياليا الأزهار (لفحة الأزهار)	٣٠ غ	٢ - ٣	٧ - ١٠ أيام	في بداية فترة الإزهار وينصح بالتبكير للحصول على الفعالية القصوى
	مونياليا الثمار (عفن الثمار)	٧٥ غ	٢	٧ - ١٠ أيام	قبل الجني
الخضراوات والبقول (حمص وعسل)	لفحة الأسكويتا	١ كغ / هكتار	٢	٧ - ١٠ أيام	أثناء فترة الإزهار

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





أغري مول

مركز قابل للذوبان في الماء

* **خصائص المبيد:** مبيد فطري جهازى يتميز بفعالته العالية في مكافحة فطريات التربة المسببة لأمراض الذبول وتعفن الجذور ، يعتمد على المادة الفعالة هيميكسازول ٣٠ ٪ و يعمل على حماية النباتات من الفطريات الضارة مع تعزيز نمو الجذور وقدرتها على مقاومة الإجهاد البيئي .

يقاوم الفطريات المسببة لأمراض الذبول وتعفن الجذور ، يحمي النباتات في مراحل النمو المختلفة ، يعزز من نمو الجذور ويحسن تحمل النبات للظروف البيئية القاسية ، يستخدم على نطاق واسع في الحضر والريف ، المحاصيل الحقلية ، والفاكهة .

* **التركيب ونسبة المادة الفعالة:** هيميكسازول 300 غرام / لتر .

* **المجموعة الكيميائية:** مشتقات الإيزوكسازول .

* **السمية النباتية:** المبيد لا يسبب سمية نباتية وتحمله جميع المحاصيل المذكورة في هذه النشرة تحت ظروف ونسب لاستخدام الموصى بها .

* **التصنيف السمي حسب معايير منظمة الصحة العالمية:** (WHO class III +) . من غير المحتمل حدوث أي أضرار ضمن معدلات الاستخدام المنصوص بها .

* **السمية:** الجرعة النصفية القاتلة LD 50 لأنثى الجرذ عن طريق الفم أكبر من : 5000 ملغ/كغ . وأكثر من 2000 ملغ / كغ عن طريق الجلد .

* **السمية للحل والطيور والأسماك:**

خفيف السمية للطيور والنحل والأسماك .

* **فترة ما قبل الحني:**

يمكن جني المحصول بعد 14 يوم من الرش لعظم المحاصيل .

* **قابلية المزج:**

قابل للمزج مع معظم المبيدات لكن يجب استشارة الوكيل والموزع قبل خلطه مع أي مادة .

المحصول	الآفات	معدل وكيفية الاستخدام
الحيار ، البطيخ ، السبانخ ، البازلاء	أمراض سقوط البادرات وأمراض الذبول النسيجية من الفطريات : بيبوم و فيوزاريوم	١٠٠ - ١٥٠ مل /ميد / ١٠٠ لتر ماء سقي البذور مباشرة بعد الزراعة بمعدل ٢ لتر محلول / م ²
مشاتل أشجار	أمراض الذبول النسيجية من الفطريات : بيبوم و فيوزاريوم	١٠٠ - ٢٠٠ مل /ميد / ١٠٠ لتر ماء سقي البذور مباشرة بعد الزراعة بمعدل ٢ لتر محلول / م ²
نباتات الزينة	أمراض الذبول النسيجية من الفطريات : بيبوم و فيوزاريوم	١٠٠ - ٢٠٠ مل /ميد / ١٠٠ لتر ماء سقي البذور مباشرة بعد الزراعة بمعدل ٢ لتر محلول / م ²

المبيدات الفطرية

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس

